

Przygotowanie do kolonoskopii w programie Badań Przesiewowych

<i>Kolejny dzień przed badaniem i w dniu badania</i>	<i>Dieta</i>	<i>Zastosowanie środków przeczyszczających</i>	
		<i>Dla osób, które <u>będą pracować</u> w dniu badania lub <u>badanie jest</u> godzinach porannych</i>	<i>Dla osób, które <u>nie będą pracować</u> w dniu badania a <u>badanie jest</u> po południu</i>
2 dni przed terminem	<p><u>Nie spożywać:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - tłustych wędlin (np. kiełbasy) i mięs - sałatek, warzyw i owoców pestkowych - pestek (siemię lniane, mak itp.) - ciemnego pieczywa - napojów gazowanych, przecierów owocowych <p><u>Zalecane:</u> Dieta półpłynna, kisiele, kleiki, ryż, makaron, chleb, gotowane mięso i ryby, napoje niegazowane, klarowne, herbata, kawa (bez fusów)</p>	Bez środka przeczyszczającego	Bez środka przeczyszczającego
1 dzień przed terminem	<p>Lekkostrawne śniadanie: lekka herbata, bułeczka</p> <p>Godz. 14-15.00 precedzony bulion</p> <p>Po godz. 15.00 woda, herbata, można ssać landrynki, miód</p>	<p><u>Około godz. 12.00</u></p> <p>połknąć 2 tabletki Bisacodylu popijając szklanką wody.</p>	<p><u>Około godz. 12.00</u></p> <p>połknąć 2 tabletki Bisacodylu popijając szklanką wody.</p>
		<p><u>O godz. 16.00</u></p> <p>rozpuścić 3 saszetki Fortransu w 3 litrach niegazowanej wody (1 saszetka / liter) i wypić w tempie 1 szklanka co 15 minut</p>	<p><u>O godz. 16.00</u></p> <p>rozpuścić 1,5 saszetki Fortransu w 1,5 litra niegazowanej wody i wypić w tempie 1 szklanka co 15 minut</p>
W dniu badania	<p><i>Osoby, regularnie przyjmujące leki nasercowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwpadaczkowe zażywają poranną dawkę</i></p> <p><u>Do czasu badania nie spożywać pokarmów</u></p> <p>Do 2 godzin przed planowaną godziną badania bez znieczulenia można pić dowolną ilość płynów niegazowanych i klarownych (także herbata, kawa bez mleka). W przypadku badań w znieczuleniu nie spożywać pokarmu i płynów 6 godzin przed badaniem</p> <p>Można ssać landrynki</p>		<p><u>O godz. 8.00</u></p> <p>rozpuścić 1,5 saszetki Fortransu w 1,5 litra niegazowanej wody i wypić w tempie 1 szklanka co 15 minut do godz 9.30</p>

** Chorzy na cukrzyce powinni sposób przygotowania skonsultować z lekarzem*

** Można poprawić smak roztworu Fortransu schładzając płyn w lodówce lub wkraplając klarowny sok z cytryny, grejfruta*

** Czas działania Fortransu 6-8 g*

W przypadku wyboru badania w znieczuleniu:

Informacje ogólne

Znieczulenie ogólne zapewnia pacjentowi bezpieczeństwo w czasie zabiegu i bezpośrednio po nim. Podczas znieczulenia pacjent pozostaje pod opieką lekarza anestezjologa. Leki znieczulające podawane są drogą dożylną. Podczas znieczulenia pacjent nie odczuwa bólu, świadomość jest ograniczona lub całkowicie zniesiona.

Przebieg znieczulenia

- Podczas zabiegu endoskopowego anestezjolog kontroluje funkcjonowanie organizmu pacjenta. Czynność serca, ciśnienie tętnicze krwi, utlenowanie krwi monitorowane są przy pomocy „aparatury rejestrującej”
- Po zabiegu pacjent przewożony jest do sali obserwacyjnej, gdzie pozostaje pod opieką anestezjologa. Czas obserwacji uwarunkowany jest stanem chorego oraz rodzajem wykonywanego zabiegu.

Możliwe powikłania

Znieczulenie, jak każde działanie lekarskie, obarczone jest ryzykiem powikłań. Prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań groźnych dla życia jest znikome, zależy przede wszystkim od stanu ogólnego pacjenta i rodzaju wykonywanego zabiegu endoskopowego. Do najczęstszych powikłań należą: reakcja alergiczna na leki, zaburzenia czynności układu oddechowego i krążenia. Zespół anestezjologiczny jest przygotowany do natychmiastowego skutecznego leczenia tych powikłań.

Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem **posiadanej dokumentacji medycznej (tylko jeśli Pacjent miał wykonywane badania i ma dokumentację)**, np. kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań endoskopowych, EKG, echokardiografia oraz aktualnych wyników badań laboratoryjnych takich jak: morfologia, elektrolity, układ krzepnięcia, grupa krwi. Pacjenci powinni dokładnie znać nazwy i dawki przyjmowanych leków lub posiadać ich spis. Wskazane jest zabranie ze sobą tych leków.

Po badaniu wykonanym w znieczuleniu pacjent przebywa w sali obserwacyjnej. Czas obserwacji zależy od rodzaju zabiegu i stanu Pacjenta. Obowiązuje 12-godzinny bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i maszyn mechanicznych oraz picia alkoholu.

Na badanie w znieczuleniu koniecznie należy przyjść z osobą towarzyszącą.